


当院では、50歳以上の方を対象に帯状疱疹ワクチン(シングリックス)の予防接種を行っております。2回の筋肉注射が必要です。2回接種することで、帯状疱疹に対する予防効果が得られます。

※1回目と2回目の間隔は2ヶ月あける必要があります。2回目は、遅くとも1回目から6ヶ月以内に接種してください。

**費用：1回あたり19,800円(税込)(自費診療)**

予約制となりますので、接種をご希望の方は主治医へご相談ください。

※公費一部費用助成制度もございます。⇒詳しくは[こちらをクリック](#)



## 帯状疱疹(たいじょうほうしん)とは…

### 原因

多くの方が子どもの時に感染する水ぼうそう(水痘)のウイルスが原因となります。水ぼうそうが治った後もウイルスは体内に潜伏するため、日本人成人の90%以上はこのウイルスが体内に潜伏しています。

加齢や疲労、ストレスがきっかけで免疫力が低下し、発症します。

特に50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。

### 症状

体の片側の一部にピリピリした痛みがあらわれ、その部分に赤い発疹はできます。痛みは徐々に悪化し、睡眠に影響が出るほど激しい場合もあります。

症状の多くは、上半身にあらわれますが、顔や目、頭などにあらわれることもあります。



### 合併症

目や耳に帯状疱疹があらわれると、めまいや耳鳴りといった合併症がみられることがあります。重症化すると視力低下や失明、顔面神経麻痺など、重い後遺症が残る危険があります。